

# **Пухлиноподібні утворення та пухлини жіночих статевих органів.**

## **1. Причини виникнення фіброміом:**

1. Підвищення вмісту естрогенів у крові.
2. Нільвищення вмісту прогестерону.
3. Запальні процеси.
4. Безплідність.
5. Численні пологи.

## **2. Клінічні симптоми фіброміом:**

1. Біль у надчревній ділянці.
2. Маткова кровотеча.
3. Підвищення температури тіла.
4. Аменорея.
5. Опущення матки.

## **3. Діагностика фіброміом:**

1. Дані анамнезу.
2. Клініка.
3. УЗД.
4. Роздільне діагностичне вишкрібання матки.
5. Усе вищезазначене.

## **4. Фіброміома матки. Показання до оперативного лікування:**

1. Невелика пухлина, безсимптомний перебіг захворювання.
2. Невелика пухлина, літній вік хворої.
3. Геморагічний синдром.
4. Безплідність.
5. Молодий вік хворої.

## **5. Маткові кровотечі не бувають:**

1. При субмукозній фіброміомі.
2. При порушенні менструального циклу.
3. При опущенні матки.
4. При злокісних пухлинах.
5. При клімаксі.

## **6. Метод діагностики кістом яєчників:**

1. Кольпоскопія.
2. Гістероскопія.
3. Дослідження за допомогою дзеркал.
4. Бімануальне піхвове дослідження.
5. Діагностичне вишкрібання матки.

## **7. Ознака доброкісної кістоми яєчника:**

1. Пухлина нерухлива.
2. Шільна консистенція.
3. Горбиста поверхня.
4. Нечіткі контури.
5. Пухлина округла, рухлива, цільноеластичної консистенції.

**8. Потенційно злоякісна кістома:**

1. Серозна.
2. Дермойдна.
3. Фібріома яєчника.
4. Фолікульома.
5. Папілярна.

**9. Лікування доброкачественных кістом:**

1. Симптоматичне.
2. Фізіотерапевтичне.
3. Біогенні стимулятори.
4. Оперативне.
5. Антибіотики.

**10. Передракові захворювання шийки матки:**

1. Справжня ерозія.
2. Дисплазія.
3. Лейкоплакія.
4. Ектропіон.
5. Еритроплакія.

**11. Фонові захворювання шийки матки:**

1. Справжня еrozія.
2. Псевдоерозія.
3. Лейкоплакія.
4. Поліпи.
5. Усе вищезазначене.

**12. Гіперпластичні процеси в матці рецидивують. Ній жінки понад 40 років. Лікування:**

1. Гормональне.
2. Біогенні стимулятори.
3. Діатермія.
4. Оперативне.
5. Загальнозміцнююче.

**13. Після курсу лікування еrozія рецидивує. Яку лікуванну процедуру треба призначити хворій?**

1. Піхвові ванночки.
2. Жирові тампони.
3. Електроконізацію.
4. Електроагуляцію.
5. Припікання ваготилом.

**14. Передракове захворювання придатків матки:**

1. Доброкачественная кістома яєчників.
2. Гострий аднексит.
3. Непрохідність труб.
4. Ніосальпінкс.
5. Піоваріум.

**15. Передракове захворювання зовнішніх статевих органів:**

1. Вульвіт.
2. Кольїт.
3. Крауроз.
4. Бартолініт.
5. Герпес.

**16. Додаткові методи дослідження при ерозії шийки матки:**

1. Пункція через заднє склепіння піхви.
2. Біопсія.
3. Гідротубація.
4. Мазок на «гормональне дзеркало».
5. Гістеросальпінгографія.

**17. Діагностика дисплазій:**

1. Цитологічне та гістологічне дослідження.
2. Пункція через заднє скlepіння піхви.
3. Кульдоскопія.
4. Лапароскопія.
5. Гістеросальпінгографія

**18. Симптоми псевдоерозії:**

1. Біль унизу живота.
2. Підвищення температури тіла.
3. Погіршення загального стану.
4. Контактні кровотечі.
5. Аменорея.

**19. Основний симптом краурозу:**

1. Біль унизу живота.
2. Свербіж, атрофія та склероз тканин зовнішніх статевих органів.
3. Нарушення менструального циклу.
4. Опущення матки.
5. Гнійні виділення.

**20. Клітор, великі та малі соромітні губи атрофуються:**

1. При раку зовнішніх статевих органів.
2. При герпесі зовнішніх статевих органів.
3. При хламідіозі.
4. При трихомонозі.
5. При краурозі.