

Тип Плоскі черви.

I варіант

1. Які органи людини не уражаються при ехінококозі:

- а. Кишки;
- б. М'язи;
- в. Печінка;
- г. Легені;
- д. Серце.

2. Дегельмінтизація хворого можлива при:

- а. Теніозі;
- б. Цистецеркозі;
- в. Ехінококозі;
- г. Альвеококозі;
- д. Всі відповіді правильні.

3. В яких члениках цестод повністю розвинута чоловіча статева система:

- а. Незрілих;
- б. Гермафродитних;
- в. Зрілих;
- г. Відірваних від стробіли.;
- д. Юних.

4. Якими трематодозами можна заразитися вживаючи раків, крабів:

- а. Фасціольозом;
- б. Опісторхозом;
- в. Дикроцеліозом;
- г. Парагонімомом;
- д. Цистецеркозом.

5. Особиста профілактика опісторхозу полягає в:

- а. Дотриманні правил особистої гігієни;
- б. Споживанні добре провареної та просмаженої риби;
- в. Споживанні добре проварених крабів;
- г. Споживанні тільки перевареної води;
- д. Споживанні добре провареної та просмаженої свинини і яловичини.

6. Другим проміжним хазяїном Сисуна ланцетоподібного є:

- а. Молюски;
- б. Риба;
- в. Раки;
- г. Краби;
- д. Мурашки.

7. Людина, вживаючи недостатньо термічно оброблену рибу, може заразитися:

- а. Теніозом;
- б. Теніаринхозом;
- в. Гіменолепідозом;
- г. Опісторхозом;
- д. Ехінококозом.

8. Діагностика ехінококу здійснюється проведенням:

- а. Рентгенологічних досліджень;
- б. Мікроскопії фекалій;
- в. Мікроскопії сечі;
- г. Мікроскопії мокротиння.

9. Широкий стьожак на статевозрілій стадії локалізується в організмі:

- а. Великої рогатої худоби;
- б. Людини;
- в. Прісноводної риби;
- г. Гризунів;
- д. Молюсків.

10. Зрілі членики збудники захворювання можуть активно виповзати з відхідника людини у випадку:

- а. Альвеококозу;
- б. Теніаринхозу;
- в. Гіменолепідозу;
- г. Дифілоботріозу;
- д. Фасціольозу.

Тип Плоскі черви.

II варіант

1. Як відбувається зараження людини ехінококом:

- а. При вживанні зараженого м'яса;
- б. Через шкіру;
- в. При контакті з собаками;
- г. При розробці туш тварин і виробці шкір;
- д. При укусах диких тварин.

2. Який паразит має найбільші розміри:

- а. Бичачий ціп'як;
- б. Свинячий ціп'як;
- в. Ехінокок;
- г. Альвеокок;
- д. Широкий стьожак.

3. Яким трематодозом можна заразитися, вживаючи раків;
- а. Фасціольозом;
 - б. Опістрохозом;
 - в. Парагонімомом;
 - г. Гіменолепідозом.

4. Зараження людини фасціольозом відбувається:
- а. Через споживання печінки великої рогатої худоби, хворої на фасціольоз;
 - б. Через недостатньо помиті овочі, фрукти;
 - в. У разі споживання прісноводних раків, крабів;
 - г. У разі споживання непросмаженого м'яса;
 - д. При контакті з собаками.

5. Проміжним хазяїном збудника теніозу є:
- а. Свиня;
 - б. Собака;
 - в. Кішка;
 - г. Корова;
 - д. Людина.

6. Остаточним хазяїном ехінокока можуть бути:
- а. Собака;
 - б. Свиня;
 - в. Людина;
 - г. Корова;
 - д. Молюск.

7. Найменшу довжину тіла має:
- а. *Taenia solium*;
 - б. *Taeniarrhynchus saginatus*;
 - в. *Echinococcus granulosus*;
 - г. *Diphyllobothrium latum*;
 - д. *Hymenolepis nana*.

8. Людина є проміжним хазяїном для таких червів:
- Opisthorchis felinus*;
- Dicrocoelium lanceatum* ;
- а. *Taeniarrhynchus saginatus*;
 - б. *Echinococcus granulosus*;
 - в. *Diphyllobothrium latum*.

9. Стробіла ехінокока містить:

- а. 200 члеників і більше;
- б. 3-4 членики;
- в. 5-7 члеників;
- г. 50-70 члеників;
- д. 1-2 членики.

10. Для особистої профілактики теніозу необхідно:

- а. Ретельно прибирати житло;
- б. Термічно обробляти перед вживанням свинину;
- в. Ретельно мити овочі, фрукти;
- г. Ретельно мити руки перед вживанням їжі;
- д. Захищатися від укусів комарів.