

# Тип Круглі черви.

## I варіант

**1. Статевозрілі аскариди паразитують у людини в:**

- а. Тонкій кишці;
- б. Товстій кишці;
- в. Печінці;
- г. Підшлунковій залозі;
- д. Легенях.

**2. Паразитуючи в органах людини, кров'ю живляться:**

- а. Аскариди;
- б. Гострики;
- в. Волосоголовці;
- г. Трихінела;
- д. Ціп'яки.

**3. Аскаридоз діагностується за допомогою мікроскопії:**

- а. Мокротиння та фекалій
- б. Тільки фекалій;
- в. Зскібка з періанальних складок;
- г. Сечі;
- д. Крові.

**4. Личинки трихінели в організмі людини виявляються в:**

- а. Дельтоподібному м'язі;
- б. Литкові м'зи;
- в. Жувальних м'язах;
- г. Міжребрових м'язах;
- д. Всі відповіді правильні.

**5. Інвазійної зрілості в ґрунті яйця досягають у представників таких видів:**

- а. Аскариди;
- б. Ришти;
- в. Трихінели;
- г. Ехінокока;
- д. Всі відповіді правильні.

**6. Заходами профілактики трихінельозу є:**

- а. Миття рук перед уживанням їжі;
- б. Термічне оброблення овочів, фруктів;
- в. Термічне оброблення свинини;
- г. Санітарний контроль м'яса на ринках і бойнях;
- д. Всі відповіді правильні.

**7. Тривалість паразитування гостриків у кишках людини без повторної інвазії не перевищує:**

- а. Одного дня;
- б. Одного місяця;
- в. Одного року;
- г. Одного тижня;
- д. Кількох років.

**8. Дракункульозом людина може заразитися:**

- а. Під час пиття сирі не фільтрованої води з відкритих водойм;
- б. Під час вживання сирого або недостатньо термічно обробленого м'яса;
- в. Під час контакту з хворим свійськими тваринами;
- г. При укусі інвазійних комарів;
- д. Під час контакту з хворою людиною.

**9. До природно-осередкових нематодозів відносять:**

- а. Аскаридоз;
- б. Ентеробіоз;
- в. Дракункульоз;
- г. Трихінельоз;
- д. Анкілостомідоз.

**10. Статевозрілі особини волосоголовця в людини паразитують:**

- а. У підшлунковій залозі;
- б. У тонкій кишці;
- в. У товстій кишці;
- г. У жовчних протоках;
- д. У легенях.

# Тип Круглі черви.

## II варіант

**1. Гострик локалізується в людини в:**

- а. Тонкій кишці;
- б. Товстій кишці;
- в. Печінці;
- г. Селезінці;
- д. Легенях.

**2. Ентеробіоз діагностується за допомогою мікроскопії:**

- а. Мокротиння;
- б. Дуоденального вмісту;
- в. Зіскрібка з періанальних складок;
- г. Сечі;
- д. Крові.

**3. Лабораторна діагностика трихінельозу ґрунтується на:**

- а. Мікроскопії фекалій;
- б. Біопсії м'язів та результатах імунологічних досліджень;
- в. Мікроскопії мокротиння;
- г. Мікроскопії мазків крові;
- д. Мікроскопія дуоденального вмісту.

**4. Статевозрілі особини волосоголовця в людини паразитують:**

- а. У підшлунковій залозі;
- б. У тонкій кишці;
- в. У товстій кишці;
- г. У жовчних протоках;
- д. У крові.

**5. Личинки аскарид в організмі людини здатні проникати в:**

- а. Міокард;
- б. Бронхи;
- в. Кров;
- г. Легені;
- д. Всі відповіді правильні.

**6. Автореінвазія можлива при:**

- а. Аскаридозі;
- б. Ентеробіозі;
- в. Трихоцефальозі;
- г. Дракункульозі;
- д. Анкілостомідозі.

**7. Через шкіру можна заразитися:**

- а. Анкілостомідозом;
- б. Аскаридозом;
- в. Трихоцефальозом;
- г. Ентеробіозом;
- д. Трихінельозом.

**8. Тривалість паразитування гостриків у кишках людини без повторної інвазії не перевищує:**

- а. Одного тижня;
- б. Одного місяця;
- в. Одного року;
- г. Десять місяців;
- д. Десять років.

**9. Дракункульозом людина може заразитися:**

- а. Під час пиття сирої не фільтрованої води з відкритих водойм;
- б. Під час вживання сирого або недостатньо термічно обробленого м'яса;
- в. Під час контакту з хворим свійськими тваринами;
- г. При укусі інвазійних комарів;
- д. Під час контакту з хворою людиною.

**10. Аскаридоз діагностується за допомогою мікроскопії:**

- а. Мокротиння та фекалій;
- б. Тільки фекалій;
- в. Зскрібка з періанальних складок;
- г. Сечі;
- д. Крові.