

Підсумкові тести з практики з дисципліни медсестринство в педіатрії

1 ВАРИАНТ

1 Під час взяття крові у пацієнта для біохімічного дослідження через порушення техніки виконання маніпуляції відбулося потрапляння крові в очі медсестри. Як повинна діяти медсестра, відповідно до наказу МОЗ № 120?

- A** Промити очі водою і закапати в них 30% розчин альбуциду
- B** Промити очі 0,02% розчином фурациліну
- C** Промити очі водою і закапати в них розчин софрадексу
- D** Промити очі слаборожевим розчином перманганату калію
- E** Промити очі водою і закапати в них 3% розчин борної кислоти

2 Лікар призначив взяти у пацієнта - учасника дорожньо-транспортної аварії кров для дослідження наявності алкоголю. Який розчин використає медсестра для знезараження шкіри пацієнта:

- A** Розчин стериліуму
- B** 0,5% розчин хлораміну
- C** 70% розчин етилового спирту
- D** 96% розчин етилового спирту
- E** 3% розчин перексиду водню

3 Медична сестра готує інструменти до стерилізації у сухожаровій шафі. Яка речовина використовується для контролю температурного режиму 180°C при повітряному методі стерилізації?

- A** Тіосечовина
- B** Винна кислота
- C** Розчин фенолу
- D** Нікотинамід
- E** Азопірам

4 Медсестра процедурного кабінету взяла кров із вени на біохімічне дослідження у пацієнта Ж. одноразовим шприцем. Що необхідно зробити медсестрі з цим шприцем після проведення маніпуляції?

- A** Викинути в смітникову корзину
- B** Промити проточною водою
- C** Промити фізіологічним розчином
- D** Провести дезінфекцію, використовуючи правило двох ємностей
- E** Передати в ЦСВ

5 Медична сестра педіатричного відділення здійснила пацієнтці М. 4 р. внутрішньовенне краплинне введення 0,9% розчину натрію хлориду, використовуючи одноразову систему. Який метод дезінфекції доцільно застосувати?

- A** Занурення в дезрозчин
- B** Пропускання через систему дезрозчину з наступним замочуванням в дезрозчині
- C** Пропускання через систему дезрозчину
- D** Промивання під проточною водою
- C** Протирання одним із дезрозчинів

6 Медсестра процедурного кабінету відкрила бікс з перев'язувальним матеріалом, доставлений із ЦСВ, і визначила, що сечовина не розплавилася. Що повинна вчинити медсестра:

- A** Написати доповідну старшій медсестрі
- B** Відправити матеріал на бактеріологічне дослідження
- C** Повернути бікс на повторну стерилізацію
- D** Використати перев'язувальний матеріал в роботі
- E** Зробити запис в журналі стерилізації

7 При проведенні ін'єкцій медична сестра використовує медичні вироби одноразового використання. Назвіть основний метод промислової стерилізації медичних виробів (шприців) одноразового використання:

- A** Хімічний
- B** Газовий

CПроменевий
DТермічний
EМеханічний

8Під час проведення передстерилізаційної обробки інструментів медична сестра ЦСВ приготувала реактив бензидину та нанесла 3 краплі на підготовлені інструменти. Що визначає медична сестра за допомогою даної проби?

AЗалишки кров
BЗалишки миючого засобу
CЗалишки ліків
DЗалишки дезінфікуючого розчину
EЗалишки олії

9Пацієнта Н. 12 р., госпіталізовано на стаціонарне лікування в інфекційну лікарню з приводу вірусного гепатиту В. Який вид дезінфекції необхідно здійснити у помешканні пацієнта?

AВогнищеву заключну
BПрофілактичну
CПовітряну
DПарову
EВогнищеву поточну

10Виконуючи внутрішньовенну ін'єкцію, медсестра вкололася голкою. Вона негайно зняла рукавички, ретельно вимила руки милом під проточною водою, ушкоджене місце обробила 70% розчином етилового спирту, наклала пластр та одягла напальчник. Вкажіть номер чинного наказу МОЗ України, відповідно до якого діяла медсестра:

A234
B408
C720
D181
E120

11Жінка, 40 років, знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні з діагнозом «гіпертонічна криза», лікар заборонив їй вставати з ліжка. У якому розчині потрібно дезінфікувати судно після подавання його хворій?

A5% розчині хлораміну
B3% розчині хлораміну
C1% розчині хлораміну
D4% розчині перекису водню
E1% розчині хлорного вапна

12Медична сестра ЦСВ після проведення стерилізації перев'язувального матеріалу паровим методом засвідчила порошкоподібний стан контрольної речовини. Про що це свідчить?

AПорушено режим стерилізації - не досягнуто необхідного тиску і температури пари
BПорушено режим стерилізації – не досягнуто необхідної температури пари
CМатеріал не підлягає стерилізації в автоклаві
DПростерилізований матеріал придатний до використання
EКонтрольна речовина низької якості

13Під час контролю якості передстерилізаційної обробки інструментів азопірамова проба виявилася позитивною. Якою повинні бути подальші дії медсестри?

AПовторити всі етапи передстерилізаційної очистки
BРетельно промити інструменти під проточною водою
CРетельно промити інструменти в миючому розчині
DРетельно промити інструменти дистильованою водою
EПовторити пробу

14Медична сестра навчає молодшу медичну сестру готувати робочий розчин хлораміну. Для приготування 3 л 3% р-ну хлораміну необхідно взяти:

A90 г хлораміну і 2910 мл води
B9 г хлораміну і 2991 мл води

C30 г хлораміну і 2970 мл води
D300 г хлораміну і 2700 мл води
E3 г хлораміну і 2997 мл води

15Скільки грамів дезактину медична сестра повинна зважити на аналітичних вагах для приготування 3-х літрів 0,2% розчину дезактину?

A0,2 г
B0,6 г
C6 г
D20 г
E60 г

16Для індивідуального захисту від внутрішньолікарняної інфекції використовують маски. Вкажіть термін захисної дії маски.

A3 год
B2 год
C1 год
D4 год
E5 год

17Після госпіталізації хворого в інфекційне відділення лікарні, медсестра повинна провести дезінфекцію квартири. Який це вид дезінфекції?

AПрофілактична дезінфекція
BВогнищева заключна дезінфекція
CВогнищева поточна дезінфекція
DДератизація
EДезінсекція

18Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД йдеться в наказі №:

A288
B408
C720
D120
E38

19Пацієнтка 55 років знаходиться на стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділенні з приводу стенокардії. Яка з проблем пацієнта буде пріоритетною?

AВиникнення пролежнів
BСтискаючий біль за грудиною
CПорушення добового діурезу
DПорушення сну
EВідсутність апетиту

20Чоловік 70 років, після смерті дружини залишився зовсім один. В нього немає рідних, немає друзів, йому не вистачає спілкування. Фізичний стан організму задовільний. Які потреби чоловіка не задоволені?

AСоціальні потреби
BФізіологічні потреби
CПотреби в безпеці
DПотреби в самоповазі
EПотреби у самовираженні

II Скласти меню дитині 6 місяців, яка народилася з масою тіла 3350г. Знаходиться на ШТУЧНОМУ вигодовуванні.

III Ви дільнична медична сестра. До вас звернулась мама з дитиною 3 міс. Зі скаргами на неспокійну поведінку, надмірну пітливість, поганий сон, облісіння потилиці.

Який діагноз поставить лікар?

Складіть план догляду за таким пацієнтом.

2 ВАРІАНТ

1Пациєнту А., 75 років, якому встановлено діагноз «інфаркт міокарду», були проведені планові медсестринські втручання за стандартом профілактики пролежнів, але заходи не дали позитивного результату: на шкірі в ділянці лопаток, крижової кістки з'явилися пухирі. Які дії треба вжити медичній сестрі?

- A**Провести оцінку і корекцію догляду
- B**Змінити призначення незалежно від думки пацієнта
- C**Порадитись з лікарем
- D**Продовжувати виконувати заплановані сестринські втручання
- E**Виконувати тільки лікарські призначення

2Вкажіть потребу першого рівня за моделлю В.Хендерсон:

- A**Регулювати фізіологічні відправлення
- B**Підтримувати температуру тіла
- C**Нормально дихати
- D**Дбати про свою безпеку
- E**Спілкуватися з іншими людьми

3Для успішної допомоги пацієнтові у вирішенні його проблем медична сестра повинна їх розглядати з урахуванням пріоритетів. До проміжних пріоритетів належать такі, що:

- A**Вимагають негайного вирішення
- B**Не мають прямого відношення до захворювання або діагнозу
- C**Ще не існують, але можуть виникнути з часом
- D**Не є невідкладними і безпечні для життя хворого
- E**Мають пряме відношення до захворювання

4Ви здійснили I етап і перейшли до II етапу медсестринського процесу. Що є метою цього етапу?

- A**Визначення ступеня досягнення мети
- B**Виконання плану сестринських втручань
- C**Формулювання сестринського діагнозу
- D**Визначення потреб пацієнта
- E**Формування бази даних про пацієнта

5Медична сестра здійснює IV етап сестринського процесу. Яка мета даного етапу сестринського процесу?

- A**Визначення критеріїв оцінки догляду
- B**Складання плану сестринських втручань
- C**Збір та аналіз одержаної інформації
- D**Виконання плану сестринських втручань
- E**Формування сестринського діагнозу

6Медична сестра провела обстеження пацієнта, встановила медсестринський діагноз. До якого етапу повинна приступити медична сестра?

- A**I етапу
- B**II етапу
- C**III етапу
- D**IV етапу
- E**V етапу

7Здійснюючи медсестринський процес, медична сестра встановлює мету медсестринських втручань. Вона може бути:

- A**Короткострокова
- B**Пріоритетна
- C**Потенційна
- D**Наявна
- E**Проміжна

8Медична сестра здійснює медсестринський процес. Втручання, які вона може проводити на основі своєї фахової компетенції без вказівок лікаря, мають назву:

- A**Незалежні

- B**Залежні
- C**Наявні
- D**Взаємозалежні
- E**Пріоритетні

9Медична сестра виконує внутрішньом'язову ін'єкцію пацієнту за призначенням лікаря. Яке втручання вона здійснює?

- A**Залежне
- B**Незалежне
- C**Наявне
- D**Взаємозалежне
- E**Пріоритетне

10Медична сестра здійснює медсестринський процес і проводить незалежні медсестринські втручання. До незалежних медсестринських втручань з перерахованих належить:

- A**Виконання підшкірної ін'єкції
- B**Введення антибіотиків
- C**Проведення очисної клізми
- D**Підготовка пацієнта до операції
- E**Зміна натільної білизни

11При реалізації плану медсестринських втручань медична сестра помітила, що мета втручання не досягнута. Які подальші дії медичної сестри?

- A**Виявити проблеми пацієнта
- B**Провести опитування пацієнта
- C**Оцінити стан хворого і провести корекцію плану догляду
- D**Здійснити план догляду
- E**Задовольнити потреби пацієнта

12За теорією А. Маслоу існує 5 рівнів людських потреб. III рівень – соціальні потреби. Яка людська потреба належить до цього рівня?

- A**Самовираження
- B**Родина
- C**Одяг
- D**Їжа
- E**Повітря

13Медична сестра здійснює медсестринський процес. На якому етапі проходить збір необхідної інформації про пацієнта?

- A**I етапі
- B**II етапі
- C**III етапі
- D**IV етапі
- E**V етапі

14Діяльність медичної сестри розглядається як медсестринський процес. Яка мета першого етапу медсестринського процесу?

- A**Оцінити загальний стан пацієнта
- B**Спланувати обсяг сестринських втручань
- C**Реалізувати заплановані втручання
- D**Навчити пацієнта самодогляду
- E**Оцінити ефективність догляду

15В міську лікарню поступила жінка, 45 років, з приводу гіпертонічної хвороби. Медична сестра збирає медсестринський анамнез і проводить об'єктивне обстеження пацієнта. Який це етап медсестринського процесу?

- A**I етап
- B**II етап
- C**III етап
- D**IV етап
- E**V етап

16Ієрархія людських потреб за А.Маслоу включає:

- A4 рівні
- B3 рівні
- C5 рівнів
- D2 рівні
- E1 рівень

17 Медсестра здійснює медсестринський процес. Другий етап медсестринського процесу - це:

- A Оцінювання загального стану пацієнта
- B Медсестринська діагностика
- C Планування обсягу медсестринських втручань
- D Реалізація спланованих втручань
- E Оцінювання ефективності догляду

18 Пацієнт Т., 12 р., знаходиться на лікуванні у хірургічному відділенні протягом 20 діб. Увесь цей час він знаходиться на суворому ліжковому режимі. Вкажіть потенційну проблему пацієнта?

- A Виникнення пролежнів
- B Поява болю у шлунку
- C Легенева кровотеча
- D Поява сухого кашлю
- E Порушення сну

19 Пацієнту призначено внутрішньом'язове введення 1 мл 5% олійного розчину вітаміну Є, але він відмовляється від ін'єкції через побоювання можливої емболії. Медсестра пояснила пацієнту, що для запобігання цього ускладнення вона:

- A Зробить масаж після ін'єкції
- B Якомога швидше введе препарат
- C Перевірить, чи не потрапила голка у судину
- D Прикладе до місця ін'єкції грілку
- E Суворо дотримається правил асептики

20 Медсестра маніпуляційного кабінету, яка контролювала внутрішньовенне струминне введення ліків студенткою медколеджу, поцікавилася, коли треба зняти джгут:

- A Після введення лікарського засобу
- B Під час введення лікарського засобу
- C Після видалення голки з вени
- D Після обробки спиртом місця ін'єкції
- E Після потрапляння голки у вену

II Скласти меню дитині 6 місяців. Яка народилася з масою міла 3400г. З знаходиться на ЗМІШАНОМУ вигодовуванні. 1 раз на добу отримує грудне материнське молоко.

III Ви дільнична медична сестра. До вас звернулась мама із дитиною 14 місяців. Зі скаргами на викривлення нижніх кінцівок, поганий сон, неспокійну поведінку, дитина не ходить.

Який діагноз поставить лікар?

Складіть план догляду за таким пацієнтом.

3 ВАРИАНТ

1 Хвора А. знаходиться на лікуванні в терапевтичному відділенні з діагнозом "хронічний гепатит", щодня отримує внутрішньовенні ін'єкції. Яка потенційна проблема може виникнути, якщо внутрішньовенні ін'єкції будуть часто виконуватися в одну й ту ж саму вену?

- A Тромбофлебіт
- B Алергічна реакція
- C Інфільтрат
- D Ліподістрофія
- E Пролежні

2 Пацієнту Р., лікар призначив внутрішньовенне введення 0,5 г ампіциліна 4 рази на день. Скільки мл розведеного антибіотику повинна набрати у шприц медсестра при стандартному розведенні?

- A 1 мл
- B 2 мл
- C 5 мл
- D 4 мл

E10 мл

3Пациєнтці Ш., 4 р., що знаходиться в терапевтичному відділенні з діагнозом «цукровий діабет» проводиться інсулінотерапія. Медсестра за призначенням лікаря вводить 12 ОД інсуліну шприцем ємністю 2 мл. Скільки мл інсуліну вона повинна набрати до шприца?

A0,1мл

B0,4 мл

C0,6 мл

D1 мл

E0,3 мл

4У приймальне відділення машиною швидкої допомоги доставлений пацієнт зі шлунково -кишковою кровотечею (три години тому було блювання у вигляді "кавової гущі"). Суб'єктивно відчуває себе задовільно, може рухатись самостійно. Як транспортувати пацієнта у відділення стаціонару?

AСамостійно в супроводі медичної сестри

BСамостійно без супроводу

CНа каталці

DНа кріслі-каталці

EНа ношах двома санітарами

5Пацієнтові призначено 20 ОД інсуліну підшкірно. Доза інсуліну у флаконі - 100 ОД в одному мл. Медична сестра виконує ін'єкцію інсуліну за 30 хвилин до сніданку, набравши в шприц:

A0,3 мл

B0,2 мл

C0,4 мл

D0,5 мл

E0,6 мл

6Пациєнтці У., 16р., з діагнозом "хронічний холецистит", лікар призначив внутрішньовенну холецистографію з білігностом. Палатна медсестра, виконує підготовку пацієнтки до дослідження, проводить пробу на чутливість до білігносту. Як медсестра буде вводити розчин білігносту для проби?

AВнутрішньовенно

BВнутрішньошкірно

CПідшкірно

DСкарифікаційно

EВнутрішньом'язево

7Пацієнтові з гіпертонічною кризою лікар призначив кровопускання. Яке оснащення найбільш гарантує дотримання інфекційної безпеки в ЛПЗ:

AГолка Дюфо з резиною трубою

BГолка довжиною 4-6 см та шприц ємністю 20 мл

CІнфузійна система одноразового використання

DГолка довжиною 4-6 см та стерильний флакон

EСистема для кровопускання одноразового використання

8При інгаляції лікарські препарати вводять в організм у дрібно розсіяному аерозолі або газоподібному стані. Назвіть спосіб застосування ліків?

AЗовнішній

BВнутрішній

CПарентеральний

DСублінгвальний

DПероральний

9Внаслідок проведеної внутрішньовенної інфузії на місці венепункції утворилася гематома. Що є найбільш вірогідною причиною цього ускладнення :

AПрокол обох стінок вени

BУшкодження окістя

CУшкодження нервового стовбура

DПрокол м'язів

EДуже щільно накладений джгут

10Після проведення внутрішньовенної ін'єкції пацієнт П., 8 р., скаржиться на біль у місці ін'єкції, почервоніння і припухлість по ходу вени. Це ускладнення має назву:

- A**Емболія
- B**Флебіт
- C**Сепсис
- D**Колапс
- E**Інфільтрат

11Медична сестра повинна відключити систему після введення інфузійних розчинів пацієнту. Для цього необхідно в першу чергу:

- A**Перекрити тік рідини затискачем
- B**Видалити голку з вени
- C**Видалити голку системи з флакона
- D**Видалити голку – повітровод з флакона
- E**Прикласти стерильний ватний тампон до місця пункції

12Пацієнту з серцевою недостатністю проведено кровопускання. Медична сестра здійснює контроль за пульсом, артеріальним тиском та рекомендує йому дотримуватись суворого ліжкового режиму з метою попередження такого ускладнення, як:

- A**Непритомність
- B**Шок
- C**Ортостатичний колапс
- D**Напад ядухи
- E**Тромбоемболія

13У пацієнта діагностована пневмонія, йому призначено цефтріаксон.Пацієнт має схильність до алергійних реакцій на знеболюючі препарати. Для проведення проби на чутливість до цефтріаксону медсестра з метою розведення антибіотика використовує такий розчин:

- A**10% розчин натрію хлориду
- B**Воду для ін'єкцій
- C**0,25% розчин новокаїну
- D**0,9% розчин натрію хлориду
- E**1% розчин новокаїну

14Медична сестра реанімаційного відділення працює з наркотичними анальгетиками. Назвіть номер наказу МОЗ України "Про затвердження порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у державних і комунальних закладах охорони здоров'я України":

- A**740
- B**234
- C**223
- D**356
- E**38

15Медична сестра процедурного кабінету контролює термін придатності стерильних розчинів. Стерильні розчини, виготовлені в аптеці і закупорені корками під обкатку, зберігаються:

- A**Не більше 10 діб
- B**Не більше 3 діб
- C**Не більше 2 діб
- D**Не більше 7 діб
- E**Не більше місяця

16Внаслідок можливого дефекту виготовлення ін'єкційна голка під час її введення у м'які тканини може раптово відламатися від муфти. З метою профілактики даного ускладнення голку необхідно вводити:

- A**На 1/2 довжини
- B**На 1/4 довжини
- C**На 2/5 довжини
- D**На 1/3 довжини
- E**На 2/3 довжини

17У маніпуляційному кабінеті після в/нутрішньом'язового введення антибіотика (500 000 ОД бензилпеніциліну натрієвої солі) пацієнт раптово відчув різку загальну слабкість, напад кашлю, ядуху, серцебиття. АТ- 85/50 мм рт.ст. Назвіть ускладнення, що виникло:

- A** Анафілактичний шок
- B** Токсико-інфекційний шок
- C** Кардіогенний шок
- D** Колапс
- E** Непритомність

18Пацієнту П., що лікується стаціонарно з приводу крупозної пневмонії, лікар призначив внутрішньом'язово цефтріаксон по 1,0 г. Назвіть анатомічну ділянку, яку частіше обирають для даної ін'єкції?

- A** Зовнішню поверхню стегна
- B** Верхньозовнішній квадрант сідниці
- C** Нижньозовнішній квадрант сідниці
- D** Внутрішню поверхню стегна
- E** Верхньовнутрішній квадрант сідниці

19Медична сестра проводить навчання пацієнта, який хворіє на цукровий діабет. Вона пояснює йому техніку введення інсуліну інсуліновим шприцем з голкою довжиною 1,5 см. Під яким кутом необхідно вводити голку?

- A** 60°
- B** 50°
- C** 90°
- D** 45°
- E** 35°

20 Пацієнту К., 9 р., після оперативного втручання на стравохід призначили штучне годування через зонд. Медична сестра готує:

- A** Стерильний тонкий шлунковий зонд
- B** Стерильний товстий шлунковий зонд
- C** Дуоденальний зонд з оливою
- D** Газовідвідну трубку
- E** Катетер

IIСкласти меню дитині 7 місяців. Яка народилася з масою тіла 3650г. Знаходиться на ШТУЧНОМУ вигодовуванні.

IIIВи дільнична медична сестра. До вас звернулась мама з дитиною 3 місяців. Яка народилась із масою тіла 3100г і зростом 50 см. Зараз вага дитини 4300г, зріст 59см. Мама запитує чи відповідають нормі ці антропометричні дані її дитини.

Обґрунтуйте свою відповідь.

4 ВАРИАНТ

1Пацієнту К, 16 років, призначено ендоскопічне дослідження слизової оболонки сигмоподібної і прямої кишок. Як називається даний метод дослідження?

- A** Ректороманоскопія
- B** Колоноскопія
- C** Фіброгастроскопія
- D** Лапароскопія
- E** Цистоскопія

2При підготовці пацієнта до холецистографії хворому призначають холевід. Назвати спосіб введення контрастної речовини?

- A** Внутрішньовенний
- B** Підшкірний
- C** Пероральний
- D** Сублінгвальний
- E** Внутрішньом'язовий

3Пацієнтові з підозрою на лямбліоз лікар призначив дуоденальне зондування. Як правильно зібрати і

відправити матеріал на лабораторне дослідження?

A Порцію В і С відправити в лабораторію в теплому вигляді

B Порцію А відправити в лабораторію в теплому вигляді

C Порцію С помістити в посуд з теплою водою

D Порцію В відправити в лабораторію в теплому вигляді

E Відправити в лабораторію всі три порції

4 Медична сестра за призначенням лікаря здійснює фракційне зондування шлунка пацієнту К., 8 р. Виберіть ентеральний подразник для шлункового зондування:

A 40% розчин глюкози

B 33% розчин магнію сульфату

C 5% розчин етилового спирту

D 10% розчин натрію хлориду

E 0,5% розчин новокаїну

5 Пацієнту О. 12 років, який скаржиться на появу червоної крові у випорожненнях протягом місяця і слабкість, призначено ендоскопічне дослідження прямої кишки. До якого дослідження повинна підготувати пацієнта медична сестра?

A Рентгенографії шлунка

B Ректороманоскопії

C Фіброгастроскопії

D Іригоскопії

E Колоноскопії

6 Пацієнт Н., 8 років, здає сечу за Зимницьким. Що визначають у кожній з 8-ми порцій сечі за Зимницьким?

A Кількість еритроцитів і циліндрів

B Кількість лейкоцитів, циліндрів

C Об'єм і відносну густину

D Наявність білка і пігментів

E Наявність цукру і кетонових тіл

7 За призначенням лікаря медична сестра готує пацієнта до обстеження шлунка. Визначте найбільш інформативний метод діагностики при захворюваннях шлунка:

A Фіброгастродуоденоскопія

B Рентгенографія шлунка

C Аналіз кала на приховану кров

D Зондування шлунка

E РН – метрія

8 Пацієнту В., 13 р., з діагнозом "хронічний гастрит" призначено ендоскопічне дослідження шлунка і дванадцятипалої кишки. Це дослідження має назву:

A Езофагогастродуоденоскопія

B Іригоскопія

C Цистоскопія

D Бронхоскопія

E Ректороманоскопія

9 Медична сестра пояснює пацієнтці правила збирання сечі для загального клінічного дослідження. Перед збиранням сечі жінка повинна здійснити туалет зовнішніх статевих органів. Яку порцію сечі із сечовипускання необхідно зібрати?

A Всю вранішню

B Першу порцію

C Останню порцію

D Всю сечу

E Тільки вранішню

10 Пацієнт Р., 3 р., знаходиться на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні з приводу захворювання, яке ускладнилось сепсисом. Добові коливання температури тіла становить 3-4°C. Який тип гарячки спостерігається в даному випадку?

A Неправильна

ВРемітуюча
СХвилеподібна
ДГектична
ЕІнтермітуюча

11 Медична сестра досліджує пульс пацієнта, у якого визначено високий артеріальний тиск. Вона з'ясувала, що пульс твердий. Це свідчить про порушення такої властивості пульсу:

АРитм
ВЧастота
СНаповнення
ДДефіцит
ЕНапруження

12 Пацієнта К. готують до оперативного втручання на органах черевної порожнини. Для підготовки пацієнта медсестра повинна застосувати клізму:

АСифонну
ВОчисну
СГіпертонічну
ДОлійну
ЕЕмульсійну

13 З метою підготовки до рентгенологічного дослідження кишківника пацієнту призначена очисна клізма. Яке положення треба надати пацієнту при проведенні очисної клізми?

АНа правому боці, ноги зігнуті у колінах
ВНа спині, ноги зігнуті у колінах
СНа лівому боці, ноги зігнуті у колінах
ДНа животі
ЕНапівлежачи

14 Пацієнт К., 16 років, знаходиться на стаціонарному лікуванні в нефрологічному відділенні. Лікар призначив визначити добовий діурез пацієнта. Він становить 3050 мл. Дайте оцінку результату.

ААнурія
ВОлігоурія
СНіктурія
ДПоліурія
ЕІшурія

15 Пацієнт С., 13 років, знаходиться на лікуванні в гастроентерологічному відділенні з діагнозом: хронічний гастрит з секреторною недостатністю. Дотримання якої дієти повинна контролювати палатня медсестра?

АСтіл № 1
ВСтіл № 3
ССтіл № 4
ДСтіл № 2
ЕСтіл № 5

16 Пацієнтці К., яка лікується з приводу хронічного гастриту, призначена дієта №1. Яка мета даної дієти?

АНормалізація секреторної та моторної функції кишечника
ВНормалізація обміну пуринів
СОбмеження механічного і хімічного подразнення слизової оболонки шлунка
ДЗменшення набряків
ЕПокращення кровообігу

17 Пацієнт, що страждає на серцеву недостатність, скаржиться медсестрі на задишку при фізичному навантаженні та виділення більшої кількості сечі вночі ніж вдень. Це заважає йому відпочивати. Таке явище називається:

АОлігурія
ВПоліурія
САнурія
ДІшурія

18У пацієнта серцево-судинна патологія. Він не знає, скільки можна вживати рідини на добу, боїться виникнення набряків. Медсестра навчає пацієнта контролювати добовий діурез та кількість вжитої рідини, пояснює їх нормальне співвідношення. В нормі добовий діурез становить:

- A**60-75% від усієї вжитої рідини
- B**70-80% від усієї вжитої рідини
- C**55-60% від усієї вжитої рідини
- D**45-50% від усієї вжитої рідини
- E**85-90% від усієї вжитої рідини

19 Пацієнтці з діагнозом: ожиріння II ст., яке не пов'язане із захворюваннями серцево-судинної та ендокринної систем, призначено дієтичне лікування. Дотримання якої дієти буде контролювати медична сестра?

- A**№ 8
- B**№ 11
- C**№ 10
- D**№ 7
- E**№ 5

20Медсестра проводить інгаляцію кисню пацієнту через носовий катетер від централізованої подачі. Для запобігання розвитку пролежнів слизової оболонки носових ходів необхідно:

- A**Змінювати положення катетера в носових ходах кожні 30-40 хвилин
 - B**Забезпечити концентрацію кисню в повітрі до 30-40%
 - C**Відрегулювати оптимальну дозу кисню 4-6 л за хвилину
 - D**Зволожувати кисень через апарат Боброва водою
 - E**Змочувати катетер стерильним ізотонічним розчином натрію хлориду і вводити на глибину 15 см
- IIСкласти меню динині 7 місяців, яка народилася з масою тіла 3700г. Знаходиться на ЗМІШАНОМУ вигодовуванні. 2 рази отримує грудне материнське молоко.
- III Ви дільничка медична сестра. До вас звернулась мама з дитиною 6 місяців. Яка народилась з вагою 3200г і зростом 51см.Зараз важить 5900г, зріст 65,5см. Мама запитує чи відповідають нормі ці антропометричні дані її дитини.
- Обґрунтуйте свою відповідь.

5 ВАРИАНТ

1Назвіть біологічно активну речовину, що міститься у секреті слинних залоз п'явки і має здатність гальмувати процеси згортання крові:

- A**Гірудин
- B**Лізоцим
- C**Мірозин
- D**Дестабілаза
- E**Гепарин

2Пацієнту Г. 67 р., що лікується стаціонарно з приводу тромбофлебиту, вводять гепарин підшкірно. Гепарин не вводять внутрішньом'язово через ризик виникнення:

- A**Тромбофлебита
- B**Ліподистрофії
- C**Гематоми
- D**Анафілактичного шоку
- E**Набряку

3В нічний час постова медсестра була викликана до хворого, який поскаржився на задишку. Який із заходів найпростішої фізіотерапії медсестра повинна застосувати?

- A**Вакуумтерапію
- B**Гірудотерапію
- C**Бальнеотерапію
- D**Аутогемотерапію
- E**Оксигенотерапію

4В реанімаційному відділенні медична сестра при дослідженні пульсу у тяжкохворого виявила, що частота пульсу складає 40/хв. Як оцінити такий пульс?

- A**Тахікардія
- B**Аритмія
- C**Брадикардія
- D**Пароксизмальна тахікардія
- E**Ниткоподібний

5У приймальному відділенні під час огляду волосистої частини голови у пацієнта Р., 16 р. виявлено педикульоз. Який дезінсекційний засіб варто застосовувати?

- A**5% борну мазь
- B**0,1% розчин дезоксону
- C**10% розчин оцтової кислоти
- D**Педилін
- E**2% розчин натрію гідрокарбонату

6У пацієнта 8 років неприємні відчуття в надчеревній ділянці, блювання, яке приносить тимчасове полегшення. Мама пов'язує свій стан із споживанням недоброякісної їжі. Яке залежне медсестринське втручання необхідно здійснити медичній сестрі в першу чергу?

- A**Дати антациди
- B**Направити на УЗД
- C**Промити шлунок
- D**Покласти міхур з льодом на епігастрій
- E**Дати проносні

7Ви працюєте постовою медичною сестрою в хірургічному відділенні. Пацієнтці дві доби тому зроблена операція холецистектомії. Вона скаржиться на біль в животі, здуття його, невідходження газів. Яке незалежне медсестринське втручання необхідно здійснити медичній сестрі на даному етапі?

- A**Ввести газовідвідну трубку
- B**Ввести спазмолітини
- C**Викликати лікаря
- D**Покласти міхур з льодом на живіт
- E**Ввести знеболюючі

8 Медична сестра кардіологічного відділення на III етапі сестринського процесу складає план медсестринського догляду за пацієнтом з гіпертонічною хворобою. Вона планує медсестринські втручання: контроль за дієтичним харчуванням, обмеження вживання солі, рідини, жирів, гострих приправ. Яка дієта відповідає цим вимогам?

- A**Дієта № 10
- B**Дієта № 5
- C**Дієта № 9
- D**Дієта № 5
- E**Дієта № 15

9Досліджуючи основні параметри пульсу медсестра з певною силою притискає артерію до внутрішньої поверхні променевої кістки для припинення пульсації. Яку властивість пульсу визначає медсестра?

- A**Напруження
- B**Частоту
- C**Ритм
- D**Глибину
- E**Наповнення

10У пацієнта К, 13 р., який знаходиться на лікуванні у неврологічному відділенні з приводу важкого розладу мозкового кровообігу, з'явилося рівномірне за глибиною дихання з паузами до 30 сек. Який патологічний тип дихання спостерігається у пацієнта?

- A**Куссмауля
- B**Чейна-Стокса
- C**Астма
- D**Ядуха
- E**Біота

11Пацієнту терапевтичного відділення П., 15 р., зі стійким закрепом, лікар призначив застосувати гіпертонічну клізму. Для виконання маніпуляції медична сестра повинна приготувати:

- A** 2% розчин натрію гідрокарбонату
- B** 10% розчин натрію хлориду
- C** 0,9% розчин натрію хлориду
- D** 4% розчин калію хлориду
- E** 1% розчину кальцію хлориду

12Після оперативного втручання з приводу гострого холециститу у пацієнтки В., 13 р., спостерігається затримка сечовиділення понад 12 годин. Яке залежне медсестринське втручання повинна виконати медична сестра?

- A** Ввести спазмолітичні препарати
- B** Дати сечогінні препарати
- C** Дати тепле пиття
- D** Здійснити катетеризацію сечового міхура
- E** Почекати самостійне сечовиділення

13Пацієнт Р., 14 р., знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу механічної кишкової непрохідності. Яке залежне медсестринське втручання необхідно здійснити медичній сестрі для передопераційної підготовки?

- A** Очисну клізму
- B** Олійну клізму
- C** Сифонну клізму
- D** Гіпертонічну клізму
- E** Медикаментозну клізму

14Медична сестра поставила хворому олійну клізму. Вона повинна попередити, що проносний ефект настає через:

- A** 10-12 хвилин
- B** 20-30 хвилин
- C** 5-7 годин
- D** 10-12 годин
- E** 1-2 години

15 У пацієнта К., 6 років, другий період гарячки. Пацієнт скаржиться на головний біль, відчуття жару, періодично марить. Температура тіла 39,7°C. Що медичній сестрі доцільно застосувати при догляді за пацієнтом?

- A** Грілку
- B** Зігрівальний компрес
- C** Припарки
- D** Гірчичники
- E** Міхур з льодом

16Пацієнту З., 17 років, медична сестра поставила напівспиртовий зігрівальний компрес на середню третину плеча. Яка тривалість застосування компресу?

- A** 6 – 8 год
- B** 4 – 6 год
- C** 10 – 12 год
- D** 3 – 4 год
- E** 2 – 3 год

17 П., 18 р., знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні. Медична сестра визначила, що добовий діурез пацієнта становить 510 мл. Як оцінити такий результат?

- A** Олігурія
- B** Анурія
- C** Ніктурія
- D** Ішурія
- E** Поліурія

18У пацієнтки М., 6 років, виник напад ядухи. Яке оптимальне положення у ліжку їй повинна надати медична сестра?

AГоризонтальне

BЛежачи на лівому боці

CНапівсидячи

DЛежачи на правому боці

EЛежачи з припіднятим нижнім кінцем

19У першому періоді гарячки пріоритетною проблемою пацієнта буде:

AГоловний біль

BМарення

CНеспокій

DОстуда

EСухість у роті

20 Пацієнт лежить у тому положенні, яке йому надали, не може самостійно повертатись, піднімати голову, верхні та нижні кінцівки. Яке положення в ліжку займає пацієнт?

AПасивне

BВимушене

CВимушене пасивне

DАктивне

EВимушене активне

IIСкласти меню дитині 5 місяців. Яка народилась із масою тіла 3900г. Знаходиться на ШТУЧНОМУ вигодовуванні.

IIIВи дільнична медична сестра. До вас звернулась мама дитини 5 років із скаргами на втрату апетиту, поганий сон, свербіж у ділянці заднього проходу, головний біль.

Який діагноз поставить лікар?

Складіть план догляду за таким пацієнтом.