

м/с I варіант – 2015

1 Медсестра під час обстеження пацієнта виявила, що його календарний вік виперед біологічний. Який це вид старіння?

- A Сповільнене
- B Передчасне
- C Прискорене
- D Фізіологічне
- E -

2

Медсестра під час обстеження пацієнтки виявила, що її біологічний вік виперед календарний. Який це вид старіння?

- A Сповільнене
- B Передчасне
- C Ретардоване
- D Фізіологічне
- E -

3

До медсестри звернулась хвора 40 р. із проблемами на загальну слабість, знижену працездатності та бадьорості, погіршення пам'яті, раннє посивіння волосся, зниженою еластичності шкіри та появу зморшок. Визначте вид старіння:

- A Прискорене
- B Сповільнене
- C Передчасне
- D Фізіологічне
- E Нормальне

4

Медсестра пояснює пацієнту, що лікар призначив для профілактики передчасної старіння полівітаміни “Декамевіт”. Яка це група препаратів?

- A Знеболюючі
- B Антибіотики
- C Протизапальні
- D Геропротектори
- E Сечогінні

5

Хвора геріатричного відділення поскаржилась медсестрі на поганий сон впродовж доби. Що Ви заплануєте в плані догляду?

- A Виконати фізичні вправи
- B Прогулянку перед сном
- C Вжити їжу перед сном
- D прослухати гучну музику

6

Хворий геріатричного відділення поскаржився медсестрі на часті закрепи. З чого почнете реалізацію плану догляду?

- A Корекції харчування
- B Постановки очисної клізми
- C Прийому проносних засобів
- D Постановки олійної клізми
- E Введення ректальних свічок

7

У хворої 64 р. діагностовано остеопороз. Яка потенційна проблема може виникнути у неї?

- A Стійкий закреп
- B Пролежні лопаток
- C Перелом шийки стегна
- D Нетримання сечі
- E Підвищення температури

8

Хворий 70 р. звернувся до медсестри із проблемою падіння, в результаті чого отримує травми. Найбільш частою внутрішньою причиною падіння є:

- A Слизька підлога
- B Недостатнє освітлення
- C Незручне взуття
- D Порушення рівноваги
- E Круті сходи

9

Хвора 68 р. звернулась до медсестри із проблемою падіння, в результаті чого отримує травми. Найбільш частою зовнішньою причиною падіння є:

- A Порушення рівноваги
- B Недостатнє освітлення
- C Зниження зору
- D Вживання ліків
- E Наявність болю

10

Хвора геріатричного відділення звернулась із проблемою - головний біль, запаморочення. Медсестринське втручання почнете із:

- A Постановки компресу
- B Постановки гірчичників
- C Введення спазмолітиків
- D Вимірювання тиску
- E Введення заспокійливих

Чище проводить санітарис - просвітницю роботу щодо пресріактикої передчасного

11 старини. Цінною з умов профілактики є:

- A Ведення здорового способу життя
- B Зменшення доходів населення
- C Погіршення екологічної ситуації
- D Зловживання алкоголем
- E Неповноцінне харчування

12

Хворий геріатричного відділення знаходиться на ліжковому режимі. З метою профілактики розвитку гіпостатичної пневмонії медсестра повинна включити в план догляду:

- A Вимірювання тиску
- B Догляд за порожниною рота
- C Дихальну гімнастику
- D Профілактику пролежнів
- E Зміну білизни

13

При пневмонії в осіб літнього та старчого віку рідко спостерігається:

- A Задишка
- B Загальна слабість
- C Швидка втомливавість
- D Кашель
- E Виражена гарячка

14

Медична сестра проводить бесіду із пацієнтом щодо профілактики рецидиву ревматичної лихоманки. Основним у реалізації плану сестринського втручання буде:

- A Загартовування організму
- B Усунення психоемоційних стресів
- C Нормалізація умов праці
- D Проведення біологіопрофілактики
- E -

15

Який з перерахованих чинників є визначальним для формування здоров'я людини?

- A Спосіб життя
- B Екологія
- C Рівень медичної допомоги
- D Стадковість
- E -

16

Який із перерахованих продуктів медична сестра може порекомендувати хворому на хронічний гепатит в стадії ремісії?

- A Туголивий жир
- B Печінку «швейцарську»
с приєдданням більвару

17

На I етапі сестринського обстеження медсестра виявила чинники, які зумовили розвиток хронічного коліту у пацієнта. Який з них належить до ендогенних?

А Гіподинамія

В Нерегулярне харчування

С Перенесена дизентерія

Д Психоемоційний стрес

Е Вживання великої кількості рідини

18

При проведенні первинної профілактики ревматичної ліхоманки сім'ї на медична сестра в першу чергу повинна звертати увагу на осіб, які:

А Мають високий рівень артеріального тиску

В Перенесли оперативне втручання

С Хворіють на виразкову хворобу шлунку

Д В дитинстві перенесли рапіт

Е Часто хворіють на ГРВІ

19

Проводячи медсестринське обстеження пацієнта необхідно з'ясувати стан здоров'я родичів. Які захворювання системи крові є генетично зумовленими?

А Хронічні хвороби печінки

В Геморагічний васкуліт

С В12-фолієводефіцитна анемія

Д Гемофілія

Е Залізодефіцитна анемія

20

Дільнична медична сестра проводить групування диспансерного контингенту. До якої диспансерної групи належать здорові люди, які не скаржаться і не мають об'ективних ознак хвороби на час обстеження та не хворіли в минулому:

А Четверта

В Перша

С Друга

Д П'ята

Е Третя

21

При медсестринському обстеженні пацієнтки 63 років з'ясувалося, що у неї виділяється сеча під час кашлю, при чиханні і будь-якому іншому напруженні. Визначте проблему пацієнтки:

А Нетримання сечі

В кіктурурі

С дігурурі

Д дігурурі

22

Пациєнці 40 років, яка має патологію шкіри правої гомілки, встановлений діагноз: мікробна екзема. Який з морфологічних елементів поліморфної висипки є характерним?

- A Пухирець
B Вузлик
C Пляма
D Кірка
E Гноячок

23

При медсестринському обстеженні хворого на лусочковий лишай медична сестра використала методику, притаманну даній патології. Вкажіть методику, яку застосувала медична сестра?

- A Накладання компресу
B Змішування розчином йоду
C Зішкрябування поверхні папул
D Отромінювання люмінесцентною лампою
E Накладання примочки

24

У пацієнтки 28 років спинномозкова травма. Що в першу чергу приготує медична сестра для надання допомоги?

- A Корглікон
B Шприц Жанс
C Седуксен
D Кофеїн
E Дерез'янний щит

25

Пациєнт 42 років поступив в неврологічне відділення з підозрою на менінгіт. Що приготує медсестра лікарю для проведення спинномозкової пункції:

- A Шприц Жанс
B Катетер
C Розчин камфорного спирту
D Пункційну голку з мандреном
E Сасульель

26

У пацієнтки 32 років виникає періодично гнівливість, агресія. У неї піднесений настрій, надмірна діяльність. Пацієнка співає, танцює, декламує вірші, має підвищений статевий потяг. Який медсестринський діагноз можна поставити?

- A Тривога
B Високий ризик суїциду
C Високий ризик травмування

27

До сімейної медичної сестри звернувся пацієнт 70 років з неоперабельною формою раку легень, який запитав чи можна йому провести евтаназію, оскільки знає, що він безнадійно хворий. Медична сестра відповіла, що в Україні евтаназія:

А Дозволена для безнадійно хворих

В Дозволена

С Кожен медичний працівник вирішує питання самостійно

Д Заборонена

Е Дозволена у разі згоди родичів

28

У дерматологічному відділені знаходиться хвора зі скаргами на сильний свербіж у ділянці правого передпліччя і кисті, які виникли зразу після того, як хвора використовувала порошок для прання "ЛОСК". Об'ективно: шкіра кисті і передпліччя гіперемована, набрякла, папулозні і везикульозні висипи. Для якого ураження це характерно?

А нейродерміт

В псоріаз

С Алергічно-контактний дерматит

Д Токсикодермія

Е Піодермія

29

Пацієнта 25 р. скаржиться на появу свербліжки, особливо вночі протягом 3-х днів. При огляді: на шкірі пальців (бокових поверхнях, міжпальцевих складках), передньої поверхні пахових ямок, на животі, сідницях, внутрішній поверхні стегон, на молочних залозах чисельні попарно розміщені папуло-везикули, екскоріації кров'яністі кірочки. Для якого захворювання це характерно?

А Алергічний дерматит

В Короста

С Секрема

Д Атопічний дерматит

Е Еритразма

30

У хворого 20 р. свіжий гострий передній гонорейний уретрит. Що треба зробити для підтвердження діагнозу?

А мазок із уретри

Б загальний аналіз сечі

С загальний аналіз крові

Д аналіз сечі за Зимницьким

Е-

31 В шсанг-інтернаті виник спалах ботуридизму. Напередодні двічі були суп, шсангу кончерьбу

Хліб, картопляне пюре, чай. Жкий продукт сприяє виникненню захворювання?

A суп

B м'ясна консерва

C хліб

D картопляне пюре

E чай

32

Жінка 35 років, яка проживає у гірському районі, звернулась до сімейного лікаря зі скаргами на потовщення і тиск в ділянці шиї, утруднене ковтання, захриплість голосу, загальну слабкість. Яке захворювання можна запідозрити?

A Ендемічний зоб

B Дифузний токсичний зоб

C Рак щитовидної залози

D Гіпотиреоз

E -

33

Хвора 25 років, госпіталізована до інфекційної лікарні з діагнозом "Черевний тиф".

Назвіть можливі джерела інфекції:

A Інфіковані м'ясопродукти

B Щури та миші

C Хворий або бактеріносій

D Хворі свині

E Інфікована вода

34

Студент приїхав на навчання з африканської країни 70 діб тому. Раптово в нього з'явився озноб., підвищилася температура тіла до 39,8 С . Через декілька годин спостерігається сильне потовиділення. Про яке захворювання можна подумати?

A холера

B пневмонія

C грип

D малярія

E черевний тиф

35

Жінка, 28 р, знаходиться на диспансерному обліку з діагнозом: хронічний гастрит типу А.

Звернулася до сімейної медсестри, щоб їй порекомендувати лікувальну мінеральну воду. Яка мінеральна вода найбільш доцільна в даному випадку?

A Свалява

B Миргородська

C Лужанська

D Поляна Квасова

E Боржомі

36

Чоловік, 62 років, який хворіє на гіпертонічну хворобу, для змінення здоров'я вириши зайнятися бігом. Яку найбільш доцільну пораду дасть сімейна медсестра у даному випадку?

A Ходьба, прогулки
B Біг до 600 м
C Марафонський біг
D Біг до 300 м
E Біг до 500 м

37

При яких захворюваннях використання ультразвукової терапії протипоказано?

- A Травма колінного суглоба
B Остеохондроз
C Контрактура Дюпюїтрана
D Радикуліт
E Порушення мозкового кровообігу

38

Завдання лікувальної фізкультури при бронхоектатичній хворобі:

- A Зменшити виведення харкотиння з бронхоектазів
B Підвищити енергетичні затрати організму
C Збільшити виведення харкотиння з бронхоектазів
D Зменшити газообмін
E -

39

У пацієнта з черевним тифом на 14 добу захворювання виникла кишкова кровотеча. Яке незалежне втручання повинна виконати медична сестра?

- A Холод на низ живота
B Зондове промивання шлунку
C Катетеризацію сечового міхура
D Введення ізотонічного розчину
E -

40

Медична сестра провела обробку шкіри хворого коростою 25% кремом бензилбензоату. На який день лікування втирання необхідно повторити?

- A 2
B 4
C 3
D 5
E 6

41

Хворий звернувся із скаргою на кровохаркання впродовж тривалого часу. захворювання слід запідохрити?

- A Бронхіальна астма
B Хронічний бронхіт

C Ексудативний плевріт

D Рак легенів

E Вогнищеву пневмонію

42

Медична сестра проводить санітарно-просвітню роботу з приводу виникнення захворювання на туберкульоз легенів. Який мікроорганізм викликає це захворювання?

A Палочка Коха

B Гемолітичний стафілокок

C Пневмокок

D Бліда спірохета

E Гонокок

43

У хворого напад стенокардії. Який найпростіший фізіотерапевтичний метод Ви використаєте?

A Міхур з льодом

B Зігриваючий компрес

C Гірчицники

D Банки

E Солюкс

44

У пацієнта діагностовано рак легенів. Яке харкотиння є характерним для цього захворювання?

A Малинове желе

B Ржаве

C Скловидне

D Слизисто-гнійне

E Кров'янисте

45

Медсестра доглядає хворого з хронічною серцевою недостатністю. Яка проблема характерна для цього стану?

A Крововиливи на шкірі

B Набряк обличчя

C Підвищення температури

D Набряки нижніх кінцівок

E Пітливість

46

Ви медична сестра алергологічного відділення. Який з перерахованих препаратів найвищу ймовірність викликати алергічну реакцію?

A Протигравцева сироватка

B Хлористий кальцій

C Аспарагінова амінокислота

D Родзинні чибоди

47

Хвору турбус надмірна маса тіла, залишка, головний біль, закрепи, м'язева слабкість, підвищений апетит. При огляді: підвищене відкладання жиру в ділянці живота сідини, стегон. Медичною сестрою діагностовано збільшення маси тіла на 40%. Який це ступінь ожиріння?

A I

B II

C III

D IV

E V

48

При обстеженні у хворого виявили "склоподібне" харкотиння, а також наявність у мокротинні спіралей Куршмана, кристалів Шарко-Лейдена. Для якого захворювання характерні дані зміни:

A Абсцесу легені

B Гострого бронхіту

C Бронхіальної астми

D Пневмонії

E Гангреди легені

49

Медична сестра у школі провела пробу Манту. Через який проміжок часу оцінюється проба Манту у пацієнта:

A 72 год

B 20-30хв

C 1 год

D 24 год

E 48 год

50

Дільнична медсестра проводить специфічну профілактику туберкульозу. Що входить в поняття специфічної профілактики туберкульозу:

A Флюорографічне обстеження населення

B Проведення проби Манту

C Санітарно-просвітня робота в осередку туберкульозу

D Подвірні обходи

E Вакцинація і ревакцинація БЦЖ та хіміопрофілактика

51

При проведенні медсестринського обстеження важкохворого, який скаржиться на біль в грудній клітці, кашель із виділенням "іржавого" мокротиння, виявили підвищення температури тіла до 39°C. Яке захворювання може запідозр-рити медсестра у пацієнта:

A Ларингіт

В Пневмонія

С Фарингіт

Д Гнійний бронхіт

Е Абсцес легені

52

Пациєнт знаходиться на лікуванні у терапевтичному відділенні з підозрою на туберкульоз легень. До якого ендоскопічного обстеження медсестра підготує пацієнта:

А Бронхоскопії

В Ірітоскопії

С Колоноскопії

Д Урографії

Е Фіброззофагодуоденоскопії з прицільною біопсією

53

У хворого на гіпертонічну хворобу виник напад язухи. АТ-220/106 мм рт.ст. У легенях поодинокі вологі хріпи в нижніх відділах. Яке ускладнення розвинулося:

А Легенева кровотеча

В Бронхіальна астма

С Серцева астма

Д Кардіогенний шок

Е Інфаркт міокарда

54

У терапевтичному відділенні перебуває пацієнт 39 років, у якого 3 тижні тому виник гострий інфаркт міокарда. Майбутнє сприймає пессимістично, скаржиться на сасінікчемність. На які моменти треба звернути увагу медичній сестрі при складанні плану незалежних сестринських втручань:

А Збільшення фізичної активності

В Заохочення хворого до самообслуговування

С Попередження можливих ускладнень

Д Підняти самооцінку пацієнта – порекомендувати психолога

Е Спостереження дільничного лікаря

55

Пациєнт під час забору крові в процедурному кабінеті знепритомив. Шкірні покриви бліді, АТ-110/75мм рт.ст., пульс-72 пошт./хв. Визначити обсяг невідкладної медсестринської допомоги:

А Інгаляції кисню, пропущеного через спирт

В Гірчичник на ділянку серця

С Положення напівсидячі

Д Інгаляції зволоженого кисню

Е Вдихання парів нашатирного спирту

56

В приймальне відділення швидкою допомогою доставлена хвора 42 років зі схвигами на болі в спігастральній ділянці, нудоту, блювання, сли-потечу, головний біль, різку загальну слабкість. Із анамнезу відомо, що вона 2 години тому ржавала недобровільну реч. А фасте винести шкідливий «к»

A Введете спазмолітики

C Промисте шлунок

D Заспокоїте пацієнту, дасте теплу грілку

E Дасте випити розчину содової води

57

При обстеженні пацієнта 48 років медична сестра виявила скарги на відсутність апетиту, відразу до м'ясої їжі та рибних страв, відчуття важкості в епігастрії, нудоту, втрату маси тіла. При пальпації живота відмічається болісність в епігастральній ділянці, пальпуються пухлиноподібне утворення. Яке захворювання запідоозрить медсестра?

A Хронічний ентероколіт

B Хронічний гастрит

C Виразкова хвороба шлунку

D Рак шлунку

E Холецистопанкреатит

58

На стационарне лікування поступила пацієнка зі скаргами на інтенсивний біль у правому підребер'ї з іrrадіацією в праву лопатку, ключицю, плече, нудоту та блювання, здуття живота, підвищена температура, остуду. Яка з проблем є пріоритетною?

A Нудота, блювання

B Біль у правому підребер'ї

C Метеоризм

D Гіркота та сухість у роті

E Гарячка

59

На стационарному лікуванні перебуває пацієнка 25 років з діагнозом: гострий гломерулонефрит. Обстежуючи пацієнку, встановлено пріоритетний сестринський діагноз: виражені набряки на обличчі. Заходи догляду були спрямовані на ліквідацію набряків. Через кілька днів набряки значно зменшилися. Ошініть ефективність догляду:

A Успішне просування пацієнки до запланованої мети

B Досягнення бажаних результатів

C Медсестринські втручання неефективні

D Необхідність переглянути план догляду

E Внесення необхідної корекції догляду

60

Хворий на цукровий діабет звернувся до медичної сестри за порадою, які продукти необхідно вилучити з раціону харчування:

A Гречана каша

B Цукерки, торти

C Овочі, фрукти

D Олія

E Варене куряче м'ясо

- 61 У пацієнта гострий лейкоз. Що незалежні сестринські втручання запланує медична сестра для запобігання запалення слизових оболонок ротової порожнини?
- A Протирати слизову щік
 - B Дати смоктати кусочки лимону для збільшення слиновиділення
 - C Полоскання рота розчинами антисептиків
 - D Зняти знімні зубні протези
 - E Психологічна підтримка хворого

62

Пацієнтки хворіє на ревматоїдний артрит. Медична сестра виявила скарги на виражену ранкову скутість, загальну слабкість, швидку стомлюваність. При складанні плану догляду вашим першочерговим завданням буде:

- A Порекомендувати лікарські засоби для поліпшення сну
- B Поліпшити загальний стан пацієнтки
- C Провести заходи спрямовані на поліпшення апетиту
- D Провести заходи спрямовані на зменшення ранкової скутості
- E Систематично проводити гігієнічні заходи шкіри

63

Пацієнт з приводу пневмонії призначений антибіотик - цефазолін. Раптово після першої ін'єкції у пацієнта з'явилось відчуття жару, потім став блідим, утруднення дихання; пульс ниткоподібний. АТ - 85/60 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у пацієнта:

- A Колапс
- B Набряк Квінке
- C Напад ядухи
- D Набряк легенів
- E Анафілактичний шок

64

У пацієнтки після вживання полуниць виник набряк обличчя, особливо набряклі губи і ніс. Потім з'явилась ядуха, гавкаючий кашель. Дихання утруднене, осипливість голосу. Який стан розвинувся у пацієнта?

- A Напад бронхіальної астми
- B Набряк Квінке
- C Анафілактичний шок
- D Алергічний ларингіт
- E Крапив'янка

65

На автобусний зупинці ви помітили непритомну людину. Анамнез не відомий. При огляді шкіра багряного кольору з синюшим відтінком, свідомість відсутня, лівий кут рота опущений. Ліві кінцівки нерухомі, падають як пліті. Дихання шумне, зінищі на світло не реагують. Пульс напруженій. Зовнішніх ознак травми не спостерігається. Яке положення треба надати хворому?

- A На животі, голову вліво
- B На спині, підшевінні місця відмітити.
- C На спині, підшевінні головні відмітити.

D На лівому боці
E На правому боці

66

У хворого після конфлікту раптово виникло психомоторне збудження: трощив меблі, був агресивний, вдарив товариша. Через 25 хвилин заснув. Після сну нічого не пам'ятав, розкаювався в скоеному. Для якого психопатологічного стану характерна така симптоматика?

- A* Фугіформний стан
B Сомнамбулізм
C Транс
D Сутінковий стан
E Патологічний афект

67

Хворий зловживає алкоголем 3 роки. Перебуває в соматичному відділенні лікарні з приводу хронічного гастриту. Ввечері раптово став збудженим, втратив орієнтацію в місці перебування і часі, хоча в своїй особі орієнтований. Хворий поривається піти з відділення. На медичну сестру не реагує. Які першочергові дії палатної медсестри?

- A* Ввести розчин аміназину
B Випустити хворого з відділення
C Викликати рідних хворого
D Фіксувати хворого до ліжка, викликати чергового лікаря
E Заспокоїти хворого

68

У пацієнтки А. 44 років, після видалення щитоподібної залози з'явилися сонливість, набряк обличчя та шиї, зниження АТ, закрепи. Лікар встановив діагноз "Гіпотиреоз". Який препарат відноситься до замісної терапії?

- A* L-тироксин
B Марказоліл
C Розчин Люголю
D Тіамазол
E Інтерферон

69

У пацієнта Ц. 30 років поступово почали збільшуватися та потовщуватися пальці на руках, збільшився лицевий череп, змінилося обличчя. Скаржиться також на головний біль, запаморочення, біль у суглобах, порушення зору, шум в вухах. На рентгенограмі черепа виявлено збільшення об'єму "турецького сідла", витончення його стінок. Вказані ознаки є проявом :

- A* Хвороби Іщенка-Кушінга
B Акромегалії
C Гігантізму
D Пухлини наднирника
E Стовбурового енцефаліту

40 Пациєнці ю., 30 років, яка скаржиться на дратливість, схуднення, загальну слабість, плаксивість, серцебиття, зниження працездатності, лікар встановив діагноз: "Дифузний токсичний зоб". До якого обстеження медсестра повинна підготувати пацієнта?

- A Визначення тирокальцитоніну в крові
- B Визначення рівня холестерину в крові
- C Визначення рівня глюкози в крові
- D Визначення рівня тироксину, трийодтироніну в крові
- E Визначення 17-кетостероїдів у крові

71

Хвора А. скаржиться на біль у поперекової ділянці, болюче сечовипускання, слабкість, головний біль, підвищення тіла до $38,8^{\circ}\text{C}$. Погіршення стану пов'язує з переохолодженням.

Об'єктивно: шкіра бліда, набряків немає. AT -120/70 мм рт.ст. Пульс – 90 за хв. С-м Пастернацького позитивний зліва. Яке дослідження дозволить підібрати ефективну терапію?

- A Бактеріологічне дослідження сечі
- B Загальний аналіз сечі
- C Загальний аналіз крові
- D Аналіз сечі за Зимницьким
- E Урографію

72

Хвора 41 р., скаржиться на підвищення температури до $39,5^{\circ}\text{C}$, кашель з виділенням "іржавого" харкотиння, задишку, біль у правій половині грудної клітки, що посилюється під час дихання. Чим обумовлений біль у грудній клітці пацієнта?

- A Частим кашлем
- B Підвищенням тиску в малому колі кровообігу
- C Ураженням плевральних листків
- D Гіпоксією дихальних м'язів
- E Обструкцією бронхіального дерева

73

У хворого Н. 62 років запідозрили рак легенів. Наявність яких клітин в мокротині характерне для цього захворювання?

- A еритроцитів
- B лейкоцитів
- C еозинофілів
- D тромбоцитів
- E Атипових клітин

74

Пациєнт Ш. 46 років скаржиться на біль у колінних, ліктьових суглобах "летучого характеру", який посилюється при рухах, температуру – $37,5^{\circ}\text{C}$ ввечері. В анамнезі – часті ангіни. При огляді суглобів спостерігаються припухлість, почервоніння. Для якого захворювання характерні дані проблеми?

- A Туберкульозний артрит
- B Ревматичний артрит

С Ревматоїдний артрит

D Гонорейний артрит

E Деформуючий остеоартроз

75

Хворий С., 71 р., поступив на лікування в терапевтичне відділення. Скаржиться на часті носові кровотечі, свербіж шкіри, кровоточивість, судинні зірочки на шкірі. Про яку патологію можна подумати?

A Вірусний гепатит

B Виразкова хвороба

C Холецистит

D Цироз печінки

E Ентероколіт

76

Пацієнт А., 37 років, потрапив у відділення зі скаргами на нудоту, блювання, біль в епігастрії, відрижку, пронос. Даний стан пов'язує з вживанням недоброкісної їжі.

Встановлено діагноз: "Гострий гастрит". Які першочергові дії медсестри?

A Вивести спазмолітині ліки

B Призначити діасту

C Призначити ліжковий режим

D Промити шлунок

E Призначити проти блювотні ліки

77

На диспансерному обліку дільниці сімейної медицини знаходиться пацієнта із хронічною серцевою недостатністю. Їй призначено вимірювання водного балансу. Що визначає це обстеження?

A Співвідношення між вжитою та виділеною рідиною за 12 годин

B Кількість рідини, що випила хвора за добу

C Співвідношення між денним та нічним діурезом

D Кількість сечі, виділеної за добу

E Співвідношення між спожитаю рідиною та виділеною сечею за добу

78

На дільницю сімейної медицини звернувся пацієнт із скаргами на інтенсивний стискаючий біль за грудиною, що віддає у ліву лопатку. Медсестра заспокоїла хвого, дала під язик нітрогліцерин, викликала лікаря. До якого дослідження слід підготувати пацієнта з метою підтвердження діагнозу?

A Електрокардіографії

B Рентгенографії органів грудної клітки

C УЗД серця

D Загального аналізу крові

E Біохімічного аналізу крові

79 У пацієнта на чубровий діабет після перебігу дистиди стан погіршився і посилився

- спрага, з'явився тільки в животі, нудота, олювання, сонливість. Суективно: спідомістъ відсутній, шкіра суха, частота дихання – 28 за хв., шумне, запах анестону з рота. Пульс – 98 за хв., АТ – 90/60 мм рт.ст. Про яке ускладнення подумати медична сестра?
- A Церебральну кому
B Гіпоглікемічну кому
C Гіперглікемічну кому
D Молочникислу кому
E Гіперосмолярну кому

80

У пацієнта розвинулась діабетична кома. Який препарат підготувати медсестра для невідкладної допомоги?

- A Глюкозу
B Інсулін
C Кордіамін
D Адреналін
E Мезатон

81

Під час нападу ниркової кольки пацієнта турбує загальна слабість, біль у поперековій лінії, часте болісне сечовипускання, нудота, незначне підвищення тіла. Хворий сквильзований. Визначте пріоритетну проблему:

- A Порушення руху
B Порушення сечовипускання
C Порушення дефекації
D Біль у попереку
E Підвищення тіла

82

У хворого 48 р., що лікується з приводу "бронхіальної астми" з'явився кашель, ядуха. Яку фармацевтичну допомогу слід надати пацієнту?

- A Зробити інгаляцію з портативного інгалятора
B Ввести підшкірно розчин ефедрину
C Ввести підшкірно розчин адреналіну
D Ввести внутрішньовенно розчин еуфіліну
E Ввести внутрішньовенно розчин преднізолону

83

Пациєнтів С., 23 років, лікар встановив діагноз "Залізодефіцитна анемія". Який продукт харчування пояснича порекомендувати медична сестра пацієнти?

- A Морську капусту
B Молочні продукти
C Овочі
D Фрукти
E М'ясні продукти

84 Пациєнта А., 22 років, яка знаходиться у гематологічному відділенні, скаржиться на біль у горлі, загальну слабість, лихоманку, крововиливи на шкірі. Які заходи медична сестра повинна включити до плану догляду за пацієнтою?

- A Застосування гірчицників
- B Зігрівальні компреси
- C Туалет порожнини рота
- D Промивання шлунку
- E Проведення оксигенотерапії

85

Хвора, 25 років, скаржиться на нудоту, відрижку повітрям, відчуття тяжкості в епігастрії, проноси. Під час огляду: язик обкладений білим нальотом, живіт болючий в епігаstralній ділянці. Яке дослідження є найбільш інформативним?

- A pH-метрія
- B Дуоденальне зондування
- C Копрологічне дослідження
- D Загальний аналіз крові
- E Загальний аналіз сечі

86

Хвора, 39 років, скаржиться на гострий, "кинджальний" біль у животі, різку загальну слабість. Захворіла раптово після фізичного навантаження. В анамнезі – виразкова хвороба дванадцятипалої кишki. Під час огляду: обличчя бліде, шкіра вкрита холодним потом, живіт дошкоподібний. Яке ускладнення розвинулось у хворої?

- A Пілоростеноз
- B Шлункова кровотеча
- C Пієстратія
- D Малігнізація
- E Перфорація

87

Пациєнт скаржиться на постійний кашель (більш зранку), з виділенням великої кількості харкотинія (до 200мл) гнійного характеру іноді $t = 37,8^{\circ}\text{C}$; ЧД – 24/хв. Яке дослідження є найефективнішим для уточнення діагнозу?

- A Флюорографія
- B Бронхографія
- C Спірометрія
- D Рентгеноскопія грудної клітки
- E Загальний аналіз мокротинія

88

У пацієнтки на цукровий діабет після введення інсуліну з'явилися різка загальна слабість, виражена пітливість, відчуття голоду, тремтіння, запаморочення. Об'єктивно: пацієнта худіша, шкіра волога, тургор збережений. Дихання не змінене. $t = 36,5^{\circ}\text{C}$, PS - 96/хв., АТ - 110/70 мм рт.ст. Що повинна зробити медсестра в першу чергу?

- A Ввести епінідермічні препарати
- B Ввести вікутрін в одній дозі

- С Надати горизонтальні положення з притисненням ногами
D Дати пацієнці з'їсти грудочку цукру
E Застосувати гарячу ванну*

89

Жінка, 56 років, звернулася зі скаргами на спрагу, загальну слабкість, пухливі з синевою шкіри, часте сечовипускання, зниження гостроти чутку. З пальпаторії - мати тахікардію та цукровий діабет. Об'ективно: пацієнтки огризна. Шкіра пухла, пузириться, волоси замінені, волосся рідке. PS - 78/жв., AT - 150/85 мм рт.ст., ЧД - 16/жв. До якого дисциплінного обслуговування пацієнта медична сестра?

- A Аналіз сечі на ацетон
B Загальний аналіз крові
C Загальний аналіз сечі
D Аналіз крові на креатинін
E Аналіз крові на глюкозу*

90

Який препарат призначають хворим на хронічний панкреатит з меткою змісної терапії?

- A Но-шпу
B Атропін
C Аллохол
D Фестал
E Папаверин*

91

Ви берете участь в обстеженні пацієнта на хронічний панкреатит. Вкажіть, до якого обстеження його треба підготувати?

- A Фіброгастроскопії
B Аналізу сечі на діастазу
C Duodenального зондування
D Холецистографії
E Колоноскопії*

92

Медична сестра гематологічного відділення, проводячи обстеження пацієнта 48 р. на хронічний лімфогрануломатоз, звернула увагу на такі ознаки:

- A Гарячку, свербіж шкіри, збільшення лімfovузлів
B Спотворення смаку, тріщини у куточках рота, ламкість нігтів
C Ранкові набряки під очима, високий артеріальний тиск
D Біль в дрібних суглобах, ранкову скутість, деформацію суглобів
E Крововиливи на шкірі, в суглоби, кровотечі*

93

В терапевтичне відділення поступив пацієнт на сухий плеврит. Яка його основна проблема?

- A Експіраторна задишка*

B Синдром обмеженої мобilitети

C Важкий сашель

D Кровохаркання

E Біль в грудній клітці при диханні

94

До сімейної медичної сестри звернувся пацієнт зі скаргами на виражену задишку із утрудненим видихом, кашель нападоподібний з виділенням тяжучого склонодібного мокротиння. Яка основна проблема пацієнта?

A Кровохаркання

B Сухий кашель

C Виражена задишка із утрудненим видихом

D Біль у грудній клітці

E Виділення мокротиння

95

У пацієнта, хворого на гіпертонічну хворобу, після неприємної розмови виник біль голови, відчуття "сітки" перед очима, болі в серці. Які першочергові незалежні втручання запланує медична сестра?

A Виміряти АТ

B Поставити гірчицники на ділянку серця

C Поставити банки вздовж хребта

D Підвісити над головою міхур з льодом

E Покласти грілку до ніг

96

Пацієнту знаходиться на диспансерному обліку з діагнозом "Ревматична лихоманка".

Яке з досліджень є найбільш інформативним?

A Аналіз сечі за Зимницьким

B Загальний аналіз крові

C Загальний аналіз сечі

D Аналіз сечі за Нечипоренком

E Аналіз крові на ревмопроби

97

До приймального відділення поступив пацієнт зі скаргами на сильний біль у колінних суглобах, набряклість, почервоніння шкіри навколо суглобів. Що могло спричинити загострення ревматичної лихоманки у хворого?

A Порушення дісти

B Переохолодження

C Емоційний стрес

D Перегрівання

E Фізична перевтома

98

До медичної сестри звернувся пацієнт, у якого після вживання цитрусових з'явився сильний свербіж та почервоніння шкіри, уртикарний висип. Яка основна проблема у цього пацієнта?

A Серцебиття

B Біль гаюби

C Ніжливіше чи темне фартухи

D Свербіж шкіри
E Задишка
99

Пациєнт 53 років поступив в кардіологічне відділення зі скаргами на інтенсивний пекучий біль за грудиною, який іrrадіює в ліве плече і руку, триває 6 - 8 годин. Який метод діагностики застосовують для підтвердження діагнозу?

- A Електроенцефалографія
- B Фонокардіографія
- C Електрокардіографія
- D Ехокардіографія
- E Сфігмографія

100

Пациєнт 42 років госпіталізований в гастроентерологічне відділення з діагнозом хронічний гастрит типу В. Вкажіть препарат, який застосовують для зниження секреції соляної кислоти.

- A Регідрон
- B Раунатин
- C Ранітидин
- D Реланіум
- E Ретаболіл

101

Пациєнт госпіталізований з підозрою на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки. До якого додаткового методу обстеження необхідно медичній сестрі підготувати пацієнта?

- A Колоноскопія
- B Ректороманоскопія
- C Гастродуоденоскопія
- D Іригоскопія
- E УЗД органів черевної порожнини

102

Пациєнт 21 року знаходиться в ендокринологічному відділенні з приводу цукрового діабету. За дотриманням пацієнтом якої дієти повинна стежити медична сестра?

- A № 1
- B № 9
- C № 5
- D № 7
- E № 10

103

Пациєнт 36 років знаходиться на лікуванні в гематологічному відділенні з такими проблемами: біль голови, головокружіння, блідість шкіри з жовтяничним відтінком, відчуття повзання "мурашок", затерпливість у кінцівках, яскравочервоний, гладкий, бачний зух який проходить після перекаплення пальцем

*Л Нечинку
В Молоко
С Шоколад
Д Яйца
Е Моркову*

104

Пациент госпитализован в гематологическое отделение с подозрением на острый лейкоз. До какого методу обследования, который имеет диагностическое значение, медсестра должна пойти пациенту?

- А Биохимический анализ крови
В Загальный анализ крови
С Коагулограмма
D Стернальная пункция
E Бактериологический анализ крови*

105

Пациент, 23 года, поступил в пульмонологическое отделение с жалобами на одышку, с утрудненным выдохом, трудно отделяемую, вязкую, стекловидную мокроту. Какое положение необходимо придать пациенту для облегчения его состояния?

- А Зафиксировать в постели
B Горизонтальное
C Приподнять головной конец
D Приподнять ножной конец
E Усадить с опорой на руки*

106

Пациент, 64 года, поступил в пульмонологическое отделение с диагнозом – рак легкого. Ночью состояние больного ухудшилось, возникло легочное кровотечение. Действие медсестры до прихода врача?

- А Грелка на грудную клетку
B Пузырь со льдом на грудную клетку
C Горчициники на грудную клетку
D Банки на грудную клетку
E Компресс на грудную клетку*

107

Пациент, 44 года, находится на лечении по поводу туберкулеза легких. Ему назначено исследование мокроты на микобактерии туберкулеза. Объясните больному правила сбора мокроты.

- А Одномоментно в стерильную плавательницу
B Одномоментно 5 мл в чистую плавательницу
C Сбор мокроты в течение 1-3 суток
D Собрать мокроту на чашку Петри с питательной средой
E.*

- 108 Пациент, 69 лет, поступил в пульмонологическое отделение, с диагнозом – эксудативный плеврит. Назначена плевральная пункция. Какую иглу приготовит медсестра?
A Игла 7-10 см, с резиновой трубкой и зажимом
B Игла Дрофо
C Игла Кассирского
D Игла Бирса
E Троакар

109

- Больной М., 44 года, находится на лечении в кардиологическом отделении. Возник приступ стенокардии. Какая приоритетная проблема у данного пациента?
A Инспираторная одышка
B Экспираторная одышка
C Удушье
D Кашель с пенистой розовой мокротой
E Боль за грудиной

110

- Больной К., 45 лет, находится на лечении по поводу гипертонической болезни. Состояние ухудшилось, усилилась головная боль, появилась тошнота, рвота. Какое медсестринско-обследование необходимо провести?
A Определить число дыханий
B Определить пульс
C Измерить АД
D Контроль диуреза
E Измерить t°

111

- Пациент, 53 года, обратился с жалобами на резкие боли за грудиной, иррадиирующие в левую руку, под лопатку. Приступ длится 10 минут. Объективно: кожа бледная, пульс – 92 уд. мин.,

АД 100/60 мм рт.ст. После приема нитроглицерина боль исчезла. Оцените результат медсестринского вмешательства?

- A Назначить другое средство*
B Эффект отсутствует
C Необходимы дополнительные назначения
D Вмешательство эффективно
E -

112

- Больной К., 59 лет, состоит на диспансерном учете по поводу язвенной болезни желудка. Предъявляет жалобы на ухудшение состояния – за 3 месяца похудел на 10 килограмм, отмечает отвращение к мясной пище. Какой метод дополнительного исследования будет запланирован?

- A Фиброгастроэзохотомия*
B Отциски язва из крови
C Жижищущие зонды ваниш

113

Больной К., 67 лет, находится на лечении с диагнозом – хронический гастрит. Отмечается отсутствие стула в течении 4 суток. По назначению врача выполнена очистительная клизма. Стула нет. Какая манипуляция показана пациенту?

- A Газоотводная трубка
- B Масляная клизма
- C Промывание желудка
- D Введение спазмолитика
- E Консультация диетолога

114

Больной М., 44 года, находится на лечении в гастроэнтерологическом отделении с диагнозом – цирроз печени. Началась рвота с примесью крови. Какое независимое сосстриное вмешательство выполнит медсестра?

- A Ввести папаверин
- B Подать грелку
- C Подать пузырь со льдом
- D Ввести аминокапроновую кислоту
- E Ввести анальгин

115

Больная Л., 54 года, находится на лечении в гастроэнтерологическом отделении с диагнозом – желчекаменная болезнь. Предъявляет жалобы на частые боли в правом подреберье. К какому обследованию необходимо подготовить пациента?

- A Рентгенография
- B Фиброгастроудоденоскопия
- C Ирригоскопия
- D Колоноскопия
- E УЗИ

116

Больной М., 24 года, находится на лечении в гастроэнтерологическом отделении с диагнозом – острый гастрит, который возник после употребления недоброкачественной пищи. Что в первую очередь необходимо выполнить медсестре для улучшения состояния?

- A Поставить сифонную клизму
- B Применить грелку
- C Применить пузырь со льдом
- D Промыть желудок
- E -

117 *Больной М., 18 лет, находится на лечении в гастроэнтерологическом отделении. Жалобы на изменение цвета мочи, гноющую вульву, имеющую запах, сопровождающиеся болезнью в промежности.*

- после перенесенной ангины. Объективно: лицо отечно, моча цвета "мясных помоев". Какой показатель должна контролировать медсестра в первую очередь?
- A* Артериальное давление
B Число дыхательных движений
C Цвет кожных покровов
D Пульс
E Симптом Пастернацкого

118

Больной К., 29 лет, состоит на диспансерном учете по поводу ревматической болезни. Назначено профилактическое лечение. Какой из перечисленных препаратов приготовит медсестра?

- A* Папаверин
B Бициллин - 5
C Преднизолон
D Диоксин
E Димедрол

119

Больной К., 59 лет, состоит на диспансерном учете по поводу ревматоидного артрита. Какие проблемы выявит медсестра при обследовании?

- A* Гипертензия
B Тошнота
C Скованность по утрам
D Боли в сердце
E Потеря аппетита

120

Больной М., 44 года, жалуется на слабость, утомляемость, шум в ушах, изменение вкуса – желание есть мел, сухость кожи, ломкость ногтей, сердцебиение. Объективно: кожа бледная

сухая, в углах рта "заеды". Что запланирует медсестра для организации питания больного?

A Уменьшить калорийность
B Увеличить количество белка
C Увеличить количество углеводов
D Увеличить количество жиров
E Увеличить количество железосодержащих продуктов

121

У хворого астматичний статус. Який препарат Ви використаєте на долікарському етапі?

- A* Пеніцілін
B Дібазол
C Інсулін
D Преднізолон
E Аналгін

122) хворого після ін'єкції антибіотика виник анафілактичний шок. Що ємо використати при наданні невідкладної допомоги?

- A Адреналін
- B Аналгін
- C Дібазол
- D Но-шпу
- E Дицинон

123

Медсестра під час проведення шлункового зондування тонким зондом пошипела у шлунковому вмісті значну кількість крові. Які її першочергові дії?

- A Продовжити зондування
- B Припинити зондування
- C Зробити перерву
- D Поставити грілку на живіт
- E -

124

У хворого критичне зниження температури тіла, з'явилися ознаки гострій судинної недостатності. Яке залежне сестринське втручання виконаєте при наданні допомоги?

- A Підняти ніжний кінець ліжка
- B Покласти грілки до ніг
- C Дати випити каву
- D Ввести судинні засоби
- E Забрати подушку з-під голови

125

Під час внутрішньовенного введення ліків у хворого з'явилися ознаки анафілактичного шоку. Надання допомоги необхідно розпочати з:

- A Введення адреналіну підшкірно
- B Накладання джгута на кінцівку
- C Подачі кисню
- D Введення еуфіліну внутрішньовенно
- E Введення преднізолону внутрішньовенно

126

У кардіологічне відділення терміново госпіталізований пацієнт з діагнозом: гострий міокарда. Йому проводиться комплекс інтенсивної терапії та догляду. При плануванні заходів медсестринської допомоги пацієнту Вашим першочерговим завданням буде:

- A Слідкувати за фізіологічними відправленнями
- B Забезпечити комплекс гігієнічних заходів догляду за шкірою
- C Спостереження за пульсом, артеріальним тиском
- D Годування пацієнта та догляду за порожниною рота
- E Забезпечити повний фізичний та психічний спокій

127 На стаціонарному пасажирів перевозять маючи при собі бронхіальну астму.

- недоліки відсутніх відмінно здійснити у разі нападу бронхіальної астми:
- A Застосувати плацебо, застосувати інгаляційно сальбутамол
 - B Застосувати плацебо, дати зволожений клоен
 - C Застосувати плацебо, поставити міхур з льодом на грудну клітку
 - D Застосувати плацебо, дати відхаркувальну мікстуру
 - E Застосувати плацебо, провести лужну інгаляцію

128

На стаціонарному лікуванні перебуває пацієнт 42 років з діагнозом: нирковокам'яна хвороба. У нього ратово виник напад ниркової колики. Яким буде першочергове незалежне відмінне, сприяюче на зменшення болю:

- A Висадете спазмолітики за призначенням
- B Дасте теплу прілку на поперекову ділянку
- C Дасте запити гарячого чаю
- D Запропонуєте інтенсивні рукові вправи
- E Поставите міхур з льодом на поперекову ділянку

129

Пацієнту на цукровий діабет медсестра за призначенням лікаря ввела 24 одиниці інсуліну. Через 20 хв. він звернувся до неї зі скаргами на відчуття сильного голоду, тремтіння кінцівок і висото тіла. Шкіра бліда, вкрита холодним потом. Яку термінову допомогу потрібно надати пацієнту:

- A прийняти друкозонижуючі
- B укласи в ложко, зігріти
- C прийняти застосунки
- D запитати сподішову чашу
- E -

130

Пацієнт звернувся до сімейної медсестри зі скаргами на сильний біль голови у потилиці, щук у вухах. Такі напади спостерігаються після психічних навантажень. АТ коливається від 150/100 до 190-110 мм рт.ст. Розвиток якого синдрому спостерігається у хворого?

- A гострий судинної недостатності
- B гострий серцевої недостатності
- C вінцескої недостатності
- D гіпертензивного
- E гіперуремічного

131

Пацієнте доставлено в приймальне відділення без свідомості. Впродовж 8 років хворіє на цукровий діабет, отримує інсулін. На роботі втратив свідомість. Об'єктивно: Шкіра чиста, відсутня, гіпертоус м'язів. АТ-115/70 мм рт.ст. Яке ускладнення основного захворювання виникло у пацієнта?

- A Міоклонічна кома
- B Гіпогіпокампальна кома
- C Гіпогіпокампальна обісіба
- D Гіпогіпокампальна кома

132

В маніпуляційному кабінеті після введення антибіотика внутрішньом'язово у пацієнта з'явились шум в вухах, почуття задухи, втрата свідомості. Яке ускладнення запідозрить медична сестра?

А Непритомність

В Анафілактичний шок

С Колапс

Д Кардіогенний шок

Е Токсико-інфекційний шок

133

У хворого 65-ти років на рак легенів виникла легенева кровотеча. Який з перерахованих препаратів слід ввести?

А Вітамін В₁₂

В Аналгін

С Адреналін

Д Гемостимулін

Е Амінокапронову кислоту

134

Хворий геріатричного відділення поскаржився медсестрі на часті закрепи. З чого почнете реалізацію плану догляду?

А Корекції харчування

В Постановки очисної клізми

С Прийому проносних засобів

Д Постановки олійної клізми

Е Введення ректальних свічок

135

У хворої 64 р. діагностовано остеопороз. Яка потенційна проблема може виникнути у неї?

А Пролежні лопаток

В Перелом шийки стегна

С Стійкий закреп

Д Нетримання сечі

Е Підвищення температури

136

Хворий 70 р. звернувся до медсестри із проблемою падіння, в результаті чого отримує травми. Найбільш частою внутрішньою причиною падіння є:

А Незручне взуття

В Недостатнє освітлення

С Порушення рівноваги

Д Слизька підлога

Е Струмі сходи

137

Хвора 68 р. звернулась до медсестри із проблемою падіння, в результаті чого отримує травми. Найбільш частою зовнішньою причиною падіння є:

- A Вживання ліків
- B Порушення рівноваги
- C Зниження зору
- D Недостатнє освітлення
- E Наявність болю

138

Хвора геріатричного відділення звернулась із проблемою - головний біль, запаморочення.

Медсестринське втручання почнете із:

- A Введення заспокійливих
- B Постановки гірчиців
- C Введення спазмолітиків
- D Постановки компресу
- E Вимірювання тиску

139

Медсестра проводить санітарно-просвітню роботу щодо профілактики передчасного старіння. Однією з умов профілактики є:

- A Ведення здорового способу життя
- B Зменшення доходів населення
- C Погіршення екологічної ситуації
- D Зловживання алкоголем
- E Неповноцінне харчування

140

У хворого астматичний статус. Який препарат Ви використаєте на долікарському етапі?

- A Інсулін
- B Дібазол
- C Преднізолон
- D Пеніцілін
- E Аналгін

141

У хворого після ін'екції антибіотика виник анафілактичний шок. Що Ви використаєте при наданих невідкладної допомоги?

- A Адреналін
- B Аналгін
- C Дібазол
- D Но-шпу
- E Дицинон

142 *це під час проведення шулькового зондування
може зонд не підійти у шулькою і
вийде зім'яту в-ть срости. Ін? перистеріт*

- A* Продовжити зондування
- B* Припинити зондування
- C* Зробити перерву
- D* Поставити грілку на живот
- E* -

143

У хворого критичне зниження температури тіла, з'явились ознаки гострої судинної недостатності. Яке залежне сестринське втручання виконасте при наданні допомоги?

- A* Підняти ніжний кінець ліжка
- B* Покласти грілки до ніг
- C* Дати випити каву
- D* Ввести судинні засоби
- E* Забрати подушку з-під голови

144

Який метод фізіотерапії показаний під час гіпертонічної кризи?

- A* інгаляції зволоженого кисню
- B* банки на грудну клітку
- C* холододні ножні ванни
- D* гірчичник на ділянку серия
- E* Гірчичник на потилицю

145

Яке ускладнення виникає при постійному введенні інсуліну в одне й те саме місце:

- A* гіпоглікемія
- B* алергія
- C* сліподистрофія
- D* гіперглікемія
- E* інсулінорезистентність

146

Пацієнт 45 років лікується в стаціонарі з приводу ексудативного плевриту. Вкажіть основні скарги хворого:

- A* нарстаюча задишка
- B* кашель з харкотинням
- C* склекочуче дихання
- D* біль голови
- E* ядуха

147

Яка діста призначається хворому при хронічному панкреатиті?

- A* № 9
- B* № 5П
- C* № 1
- D* № 7
- E* № 10

148

- Яке обстеження має найвагоміше значення в діагностиці гіпертонічної хвороби?
- A фонокардіографія
 - B дослідження крові
 - C спірографія
 - D дослідження артеріального тиску
 - E рентгенографія

149

- Вкажіть типові зміни шкіри при системному червоному вовчаку:
- A вузловата еритема
 - B кільцевидна еритема
 - C піодермія
 - D судинні зірочки
 - E еритема у вигляді метелика

150

- Вкажіть основну групу ліків для лікування алергічних захворювань:
- A антигістамінні
 - B антиагреганти
 - C антациди
 - D антигоністи кальцію
 - E антидепресанти